

B. Höpfer, Mittelbronzezeitliche Landnutzung in Gunst- und Ungunsträumen des nordwestlichen Alpenvorlands.  
Die Fundstellen Engen-Anselfingen ‚Breite‘ im Hegau sowie Leutkirch ‚Untere Auen‘ und ‚Urlauer Tann‘  
im Westallgäu in ihrem regionalen Kontext. RessourcenKulturen 32 (Tübingen 2025).

– Digitalanhang –

**\*Tab. 129: Untersuchungsgebiet Westallgäu, prozentuale Anteile der Leitbodentypen im Westallgäu sowie im Pufferbereich aller Chronologiestufen.**

N <sub>sample</sub>	Westallgäu	Bz								Ha				„Bz“ „Vorg.“			
		A1	A1?	A2	A2?	B	B?	C	C?	D	D?	A	A?			B	B?
	14007 (+67)	-	413	-	564 (+48)	811	175 (+42)	193	448 (+23)	56	227	-	745	193	357	-	12028 (+237)
Braunerde v.a. aus Terrassenschottern/Fließerden	3,85	-	-	-	11,70	25,77	-	93,26	13,84	25,00	19,86	-	23,36	-	28,85	-	7,99
(Para-) Braunerde, teils vergleyt, v.a. aus (Löss-) Lehm/Terrassenschotter	2,56	-	-	-	15,07	28,24	-	-	19,42	-	9,75	-	5,37	-	-	-	6,45
Braunerde, häufig podsoliert	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
(Para-) Braunerde aus Würm-Geschiebemergel	25,00	-	35,35	-	12,23	22,93	20,00	-	32,81	-	35,74	-	27,11	-	18,77	-	4,28
Riß-Parabraunerde	13,48	-	-	-	0,35	-	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,71
Würm-Parabraunerde	30,08	-	33,66	-	46,10	23,06	50,29	-	16,96	-	34,30	-	29,13	100,00	32,77	-	33,82
Pararendzina/Parabraunerde aus Würmschotter oder Molassesediment	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	18,92
Kalkpaternia	2,65	-	-	-	-	-	20,57	-	16,96	41,07	-	-	-	-	-	-	4,68
Nieder-/Hochmoor	8,69	-	-	-	3,37	-	6,29	-	-	-	-	-	13,96	-	18,21	-	6,72
Gley/Kalkgley/Anmoorgley...	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	-	-	-	-	-	-	0,51
Auenlehm...	2,16	-	30,99	-	11,17	-	-	-	-	-	0,36	-	0,27	-	0,28	-	3,40
Vega	0,56	-	-	-	-	-	-	6,74	-	-	-	-	0,81	-	1,12	-	0,26
Pseudogley-/Pelosol-/Parabraunerde aus Würm-Geschiebemergel/Beckenton	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewässer	0,48	-	-	-	8,51	-	24,00	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	2,64
%gesamt	100,48	-	100,00	-	108,51	100,00	124,00	100,00	105,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1,97